

# MA2001 Envariabelanalys

Något mer om integraler

Mikael Hindgren



HÖGSKOLAN  
I HALMSTAD


27 november 2024

## Exempel 1

Beräkna arean av det område som begränsas av kurvan  $y = \frac{2}{x}$  och linjen  $y = 3 - x$ .

### Lösning:

Skärningspunkterna:  $\frac{2}{x} = 3 - x \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1, x_2 = 2$



$$\frac{2}{x} < 3 - x \text{ för } 1 < x < 2 \Rightarrow$$


$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 \left( 3 - x - \frac{2}{x} \right) dx = \left[ 3x - \frac{x^2}{2} - 2 \ln |x| \right]_1^2 \\ &= 6 - 2 - 2 \ln 2 - \left( 3 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} - 2 \ln 2 \text{ a.e.} \end{aligned}$$

## Exempel 2

Beräkna arean av en ellips med halvaxlarna  $a$  och  $b$ .

# Båglängd

Vi söker längden av en funktionskurva  $y = f(x)$ ,  $a \leq x \leq b$ .



$$\Delta L \approx \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \Delta x$$

$$\Rightarrow L \approx \sum \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \Delta x$$

$$\rightarrow \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad \text{då} \quad \Delta x \rightarrow 0$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

## Exempel 3

Bestäm längden av kurvan  $y = f(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ,  $0 \leq x \leq 1$ .


# Rotationsvolym

Rotation kring  $x$ -axeln:

$$V_{\text{cyl}} = \pi(f(x))^2 \Delta x \Rightarrow V \approx \sum V_{\text{cyl}} = \sum \pi(f(x))^2 \Delta x$$

$$\rightarrow \pi \int_a^b (f(x))^2 dx \quad \text{då} \quad \Delta x \rightarrow 0$$

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$




Rotation kring  $y$ -axeln:

$$V_{\text{cyl}} = \pi x^2 \Delta y \Rightarrow V \approx \sum V_{\text{cyl}} = \sum \pi x^2 \Delta y$$

$$\rightarrow \pi \int_{f(a)}^{f(b)} x^2 dy \quad \text{då} \quad \Delta y \rightarrow 0$$

$$V = \pi \int_{f(a)}^{f(b)} x^2 dy$$



## Exempel 4

Bestäm volymen av en rotationsellipsoid.

## Exempel 5

Bestäm volymen av den kropp som uppkommer då kurvan  $y = e^x$ ,  $0 \leq x \leq 1$  roterar kring  $y$ -axeln.


# Rotationsytor

Vi söker arean av den kropp som uppkommer då kurvan  $y = f(x) \geq 0$ ,  $a \leq x \leq b$ , roterar kring  $x$ -axeln:

$$A_{\text{kon}} \approx 2\pi f(x)\Delta L = 2\pi f(x)\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \Delta x$$

$$\Rightarrow A \approx \sum A_{\text{kon}} = \sum 2\pi f(x)\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2} \Delta x$$

$$\rightarrow 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \text{ då } \Delta x \rightarrow 0$$



Rotation kring  $x$ -axeln ( $f(x) \geq 0$ ):

$$A = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

**Anm:**  $y = f(x)$  roterar kring  $y$ -axeln  $\Leftrightarrow y = f^{-1}(x)$  roterar kring  $x$ -axeln.

# Rotationsytor

## Exempel 6

Beräkna arean av en sfär med radie  $r$ .

## Exempel 7

Beräkna volymen och arean av den kropp som uppkommer då kurvan

$$y = f(x) = \frac{1}{x}, \quad x \geq 1, \text{ roterar kring } x\text{-axeln.}$$


# Numerisk integration

Antag att vi vill beräkna ett approximativt värde på integralen  $\int_a^b f(x) dx$ .


Metod:

- Dela in intervallet  $[a, b]$  i ett antal delintervall
- Approximera  $f(x)$  i varje delintervall med en funktion som är lätt att integrera


Några alternativ:



Riemannsumma:  
 $f(x) \approx a$  (konstant)



Trapetsformeln:  
 $f(x) \approx ax + b$



Simpsons formel:  
 $f(x) \approx ax^2 + bx + c$




# Numerisk integration

## Simpsons formel

Antag att  $f(x) \approx p(x) = ax^2 + bx + c$  i  $[-h, h]$ :

$$\int_{-h}^h \underbrace{(ax^2 + bx + c)}_{p(x)} dx = \left[ \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \right]_{-h}^h$$

$$= 2 \left( \frac{ah^3}{3} + ch \right)$$



Om  $p(x)$  går genom punkterna  $(-h, y_0)$ ,  $(0, y_1)$  och  $(h, y_2)$  kan vi enkelt bestämma  $a$  och  $c$ :

$$\begin{cases} p(-h) = a(-h)^2 + b(-h) + c = y_0 \\ p(0) = c = y_1 \\ p(h) = ah^2 + bh + c = y_2 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{1}{2h^2}(y_2 + y_0 - 2y_1)$$

$$\Rightarrow \int_{-h}^h p(x) dx = 2 \left( \frac{\frac{1}{2h^2}(y_2 + y_0 - 2y_1)h^3}{3} + y_1 h \right) = \frac{(y_2 + y_0 - 2y_1)h}{3} + 2hy_1$$


$$\stackrel{\Delta x = h}{=} \frac{\Delta x}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

# Numerisk integration

## Simpsons formel

Vi kan utnyttja resultatet för att beräkna ett approximativt värde på integralen

$$\int_a^b f(x) dx$$



Vi delar upp intervallet i ett **jämmt antal** ( $n$ ) delintervall med samma längd  $\Delta x$ :

$$x_0 = a, \quad x_1 = a + \Delta x, \quad x_2 = a + 2\Delta x, \quad \dots \quad x_n = a + n\Delta x, \quad \Delta x = \frac{b - a}{n}$$

# Numerisk integration

## Simpsons formel

Vi kan nu approximera  $f(x)$  med ett andragsgradspolynom  $p(x)$  i varje delintervall  $[x_i, x_{i+2}]$  och utnyttja vårt tidigare resultat:

$$\int_{-h}^h p(x) dx = \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} (y_0 + 4y_1 + y_2) + \frac{\Delta x}{3} (y_2 + 4y_3 + y_4) + \dots + \frac{\Delta x}{3} (y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n)$$

### Sats 1 (Simpsons formel)

Om  $f(x)$  är fyra gånger kontinuerligt deriverbar på intervallet  $[a, b]$  så är

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{3n} (f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + \dots \\ &+ 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(b)) + R_n \end{aligned}$$

där resttermen

$$R_n = \frac{(b-a)^5}{180n^4} f^{(4)}(\xi), \quad a \leq \xi \leq b$$

# Numerisk integration

## Simpsons formel

### Exempel 8

Beräkna ett approximativa värde på integralen  $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$  med Simpsons formel för  $n = 4$  och uppskatta felet i approximationen.

### Lösning:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sin x \, dx &\approx \frac{b-a}{3n} (f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(b)) \\ &= \frac{\pi}{12} \left( \sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right) \\ &= 2.00455975\dots \end{aligned}$$

$$|R_4| = \left| \frac{(b-a)^5}{180 \cdot n^4} f^{(4)}(\xi) \right| = \left| \frac{\pi^5}{180 \cdot 4^4} \sin(\xi) \right| \leq \frac{\pi^5}{180 \cdot 4^4} = 0.0066410\dots \leq 0.01$$

$$\therefore \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 2.00 \pm 0.01 \quad (\text{Anm: Exakt värde på integralen är } 2.)$$